Communication InterAuriculaire (CIA)

Dr N.Derridj

Cardiologie pédiatrique

Hôpital Necker Enfants malades

**Centre de Référence des Malformations Cardiaques Congénitales
Complexes M3C**

Epidémiologie

Table 1. The prevalence and percentages of 27 CHD subtypes

CHD subtype	Prevalence of CHD subtype per thousand (95% confidence interval)	Percentage of CHD subtype, % (95% confidence interval)
Ventricular septal defect	3.071 (2.845–3.305)	35.568 (33.876–37.278)
Atrial septal defect	1.441 (1.215–1.687)	15.378 (13.492–17.363)
Patent ductus arteriosus	1.004 (0.803–1.228)	10.172 (8.519–11.954)
Pulmonary stenosis	0.546 (0.485–0.611)	6.233 (5.703–6.784)
Tetralogy of Fallot	0.356 (0.326–0.387)	4.422 (4.064–4.794)
Transposition of the great arteries	0.295 (0.269–0.322)	3.819 (3.446–4.210)
Atrioventricular septal defect	0.290 (0.265–0.316)	3.595 (3.302–3.900)
Coarctation of the aorta	0.287 (0.261–0.314)	3.570 (3.273–3.879)
Pulmonary arteriovenous aneurysm	0.272 (0.153–0.425)	2.975 (1.858–4.343)
Congenital heart block	0.268 (0.028–0.752)	3.223 (0.268–9.263)
Aortic valve insufficiency	0.251 (0.137–0.400)	2.318 (1.271–3.667)
Aortic stenosis	0.186 (0.161–0.214)	2.334 (2.016–2.674)
Hypoplastic left heart syndrome	0.178 (0.162–0.195)	2.564 (2.251–2.897)
Mitral insufficiency	0.152 (0.097–0.220)	1.348 (0.899–1.886)
Tricuspid atresia or stenosis	0.117 (0.091–0.146)	1.071 (0.905–1.250)
Double outlet right ventricle	0.106 (0.090–0.124)	1.303 (1.127–1.491)

Etiologies des CIA

Le plus souvent sporadiques/ idiopathique

Parfois formes familiales associées :

- BAV du 1er degré : gène *Nkx2.5*
- Syndrome de Holt-Oram
- Downs syndrome
- *GATA4*, *Tbx5*, *TGFβ*

❖ Environnement : Cannabis

Reece, A.S., Hulse, G.K. Contemporary epidemiology of rising atrial septal defect trends across USA 1991–2016: a combined ecological geospatiotemporal and causal inferential study. *BMC Pediatr* **20**, 539 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12887-020-02431-z>

Posch, M.G., Perrot, A., Berger, F. *et al.* Molecular genetics of congenital atrial septal defects. *Clin Res Cardiol* **99**, 137–147 (2010). <https://doi.org/10.1007/s00392-009-0095-0>

Embryologie du SIA

Anatomie des CIA

A

B

CIA Ostium Primum

- 2–3% of the ASDs
- associated with Down syndrome

CIA Ostium Primum

CIA Ostium Secundum

80-90 % des CIAs

CIA Ostium Secundum

CIA Sinus venosus

2–10%

Embryologie controversée

La CIA du SV supérieur est un défaut de communication entre l'OD et la jonction VCS - OG.
Souvent associé à un RVPAp du LSD dans la VCS.

La CIA du SV inférieur est un défaut de communication entre l'OD et la jonction VCI - OG.
Peut être associé à un RVPAp du LID

CIA low septal defect ou CIA basse

Oreillette unique

CIA du sinus coronaire

< 1%

Absence de septation entre l'OG inférieure et le toit du SC
Fréquemment associé à une VCSG

Physiologie du shunt à l'étage atrial

Le shunt gauche-droite est dépendant de :

- La **COMPLIANCE** des ventricules droit et gauche **en diastole**.

=> Surcharge volumétrique diastolique du Ventricule droit

Evolution

- Une petite CIA peut se fermer spontanément
- Troubles du rythme auriculaire (fibrillation ou flutter) peuvent survenir après 30 ans
- La dysfonction ventriculaire droite est tardive
- L'hypertension artérielle pulmonaire est très rare

Traitement

Indications

- CIA symptomatique
- CIA hémodynamiquement significative, $Q_p/Q_s > 1.5 = VD$ dilaté

Modalités

- CIA ostium secundum: 90 % de fermeture par KT et 10 % par chirurgie
- Les autres CIA : fermeture chirurgicale

Fermeture per cutanée

Conditions pour fermeture percutanée

- Poids minimum 10 kg
- Anatomie de la CIA type OS
- Berge inférieure au niveau de la VCI
- Le diamètre maximal de la CIA + 14 mm doit être inférieur au diamètre du septum
- Les berges doivent mesurer plus de 5 mm sauf la berge rétro-aortique
- Le septum inter-auriculaire doit être solide

KT vs Chir

Comparison Between Transcatheter and Surgical Closure of Secundum Atrial Septal Defect in Children and Adults Results of a Multicenter **Nonrandomized Trial**

TABLE 4 Procedural Characteristics and Patient Outcomes According to Defects Size and Patients Body Weight

	Large Defects		p Value	Low Body Weight		p Value
	ASD <20 mm/m ² (n = 1,072)	ASD ≥20 mm/m ² (n = 254)		≤15 kg (n = 96)	>15 kg (n = 1,230)	
Age, yrs	10.1 (0.7-18)	6 (1-18)	<0.001	3.8 (0.7-6)	9.3 (6-18)	<0.001
Weight, kg	31 (3.6-92)	20 (3.7-78)	<0.001	13 (3.6-15)	30 (15-92)	<0.001
ASD indexed diameter, mm/m ²	12 (3.5-20)	23 (20-48.6)	<0.001	25 (9.4-48.6)	14 (3.5-39)	<0.001
Deficient rims (n = 1,133)						
Aortic	246 (23.0)	75 (33.0)	0.52	19 (25.0)	378 (30.7)	0.32
Posterior	120 (11.4)	41 (18.5)	0.26	11 (14.0)	196 (15.9)	0.89
Anteroinferior	75 (7.1)	37 (16.5)	0.003	9 (12.5)	132 (10.7)	0.69
Posterosuperior	16 (1.5)	9 (4.0)	0.09	2 (2.6)	29 (2.3)	0.86
Inferior	112 (10.6)	43 (19.3)	0.06	12 (16.0)	180 (14.6)	0.72
Superior	29 (2.7)	20 (9.0)	0.001	8 (10.6)	52 (4.2)	0.01
ASO size, mm	18 (4-38)	20 (4-40)	0.007	16 (5-26)	18 (4-40)	0.001
Procedural success	1,042 (97.2)	222 (87.4)	<0.001	91 (94.7)	1,173 (95.4)	0.126
Fluoroscopy time, min (n = 1,214)	4.6 (0.5-54)	4.9 (0.5-120)	0.49	6 (2-38)	5.3 (0.5-120)	0.24
Periprocedural complications						
Device migration	6 (0.5)	4 (1.5)	0.008	0 (0.0)	10 (0.8)	0.38
Pericardial effusion	3 (0.2)	3 (1.1)	<0.001	2 (2.0)	4 (0.3)	0.002
Conduction abnormality	3 (0.2)	2 (0.7)	0.008	2 (2.0)	3 (0.2)	0.001
Mitral regurgitation	1 (0.1)	0 (0.0)	0.59	1 (1.0)	0 (0.0)	0.02
Transient hemolysis	1 (0.1)	0 (0.0)	0.59	0 (0.0)	1 (0.1)	0.76
Air embolus	1 (0.1)	0 (0.0)	0.59	0 (0.0)	1 (0.1)	0.76
Follow-up, yrs (n = 1,158)	3 (0.5-18)	3 (0.5-17)	0.22	3 (0.5-17)	3 (0.5-18)	0.83
Delayed complications						
Arrhythmias	6 (0.5)	2 (0.7)	0.27	1 (1.0)	7 (0.5)	0.44
Stroke	0 (0.0)	2 (0.7)	0.007	0 (0.0)	2 (0.1)	0.76
PAH	2 (0.1)	0 (0.0)	0.59	2 (2.0)	0 (0.0)	<0.001

Values are median (range) or n (%).

PAH = pulmonary arterial hypertension; other abbreviations as in Table 2.

Figure 2. Comparison of curves of freedom from complication probability between device group and surgical group. **Lighter lines** beside each curve are the 95% confidence interval levels.

Fermeture chirurgicale

Traitement chirurgical indications :

- CIA os impossibilité ou échec de fermeture percutanée
- CIA sinus venosus avec shunt significatif
- CIA ostium primum avec shunt significatif et/ou fuite significative de la valve AV gauche

Les voies d'abord sont :

- la sternotomie le plus souvent ou mini-sterno
- la thoracotomie postérieure droite chez la jeune fille
- la thoracotomie sous-mammaire droite chez l'adolescente