

Πίνακας Δικαιούχων Αναμνηστικής δόσης Εμβολίων στην Ελλάδα (1/3)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το γενικό πληθυσμό σχετικά με τον εμβολιασμό του

Ηλικιακή Ομάδα	Εμβόλια	Βασικός εμβολιασμός	1 ^η Αναμνηστική	2 ^η Αναμνηστική	3 ^η Αναμνηστική
Γενικός Πληθυσμός					
5 - 11 ετών	Pfizer Παιδιατρικό (COMIRNATY) (Για ηλικίες 5 έως <12 ετών)	1 ^η δόση → 2 ^η δόση	Δεν έχει εγκριθεί	Δεν έχει εγκριθεί	
12 – 17 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX)	1 ^η δόση → 2 ^η δόση	Έχει εγκριθεί μόνο για ομάδες αυξημένου κινδύνου (Πίνακας 2)	Έχει εγκριθεί μόνο για ομάδες αυξημένου κινδύνου (Πίνακας 2)	
18 – 29 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID)	1 ^η δόση → 2 ^η δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax	Έχει εγκριθεί μόνο για ομάδες αυξημένου κινδύνου (Πίνακας 2)	
30 – 59 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Astra Zeneca	1 ^η δόση → 2 ^η δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax	Συστήνεται εξατομικευμένα με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Συστήνεται εξατομικευμένα με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη 2 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)
60 και άνω	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Astra Zeneca	1 ^η δόση → 2 ^η δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)

Παρατηρήσεις

^ Το προτεινόμενο διάστημα μεταξύ 1^{ης} και 2^{ης} δόσης για το βασικό εμβολιασμό είναι 6-8 εβδομάδες

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες συστάσεις της ΕΕΕ σε άτομα με προηγούμενη νόσηση από κορωνοϊό δίνεται η δυνατότητα αναμνηστικού εμβολιασμού με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 3 μηνών μετά τη νόσηση.

Πίνακας Δικαιούχων Εμβολίων στην Ελλάδα (2/3)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για **πολίτες αυξημένου κινδύνου** σχετικά με τον εμβολιασμό τους

Ηλικιακή Ομάδα	Εμβόλια	Βασικός εμβολιασμός	1 ^η Αναμνηστική	2 ^η Αναμνηστική	3 ^η Αναμνηστική
Πολίτες Αυξημένου Κινδύνου					
5 - 11 ετών	Pfizer Παιδιατρικό (COMIRNATY) (Για ηλικίες 5 έως <12 ετών)	1 ^η δόση → 2 ^η δόση	Δεν έχει εγκριθεί	Δεν έχει εγκριθεί	Δεν έχει εγκριθεί
12 – 17 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX)	1 ^η δόση → 2 ^η δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Δεν έχει εγκριθεί
18 – 29 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID)	1 ^η δόση → 2 ^η δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Δεν έχει εγκριθεί
30 – 59 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Astra Zeneca	1 ^η δόση → 2 ^η δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)
60 και άνω	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Astra Zeneca	1 ^η δόση → 2 ^η δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)

Παρατηρήσεις

^ Το προτεινόμενο διάστημα μεταξύ 1^{ης} και 2^{ης} δόσης είναι 6-8 εβδομάδες

Σε εγκύους συστήνεται η χορήγηση πρώτης ή δεύτερης αναμνηστικής δόσης με επικαιροποιημένο εμβόλιο σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μήνες μετά την προηγούμενη δόση

Πίνακας Δικαιούχων Εμβολίων στην Ελλάδα (3/3)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το γενικό πληθυσμό σχετικά με τον εμβολιασμό του με το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Ηλικιακή Ομάδα	Εμβόλια	Αρχικό Σχήμα Εμβολιασμού	1 ^η Αναμνηστική	2 ^η Αναμνηστική	3 ^η Αναμνηστική
Γενικός Πληθυσμός					
18 – 29 ετών	Johnson & Johnson (JANSSEN)*	1 δόση	Τουλάχιστον 2 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Johnson & Johnson (JANSSEN)*	Μόνο για ομάδες αυξημένου κινδύνου	
30 – 59 ετών	Johnson & Johnson (JANSSEN)*	1 δόση	Τουλάχιστον 2 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Johnson & Johnson (JANSSEN)*	Συστήνεται εξατομικευμένα με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Συστήνεται εξατομικευμένα με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη 2 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)
60 και άνω	Johnson & Johnson (JANSSEN)*	1 δόση	Τουλάχιστον 2 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Johnson & Johnson (JANSSEN)*	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2 ^η αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)

Παρατηρήσεις

* Στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί 2 δόσεις του εμβολίου Johnson & Johnson (JANSSEN) σε άτομα άνω των 30 ετών, ο πολίτης συστήνεται να προγραμματίσει μία αναμνηστική δόση με επικαιροποιημένο διδύναμο εμβόλιο

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες συστάσεις της ΕΕΕ σε άτομα με προηγούμενη νόσηση από κορωνοϊό δίνεται η δυνατότητα αναμνηστικού εμβολιασμού με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 3 μηνών μετά τη νόσηση.